

# Imprid Skog®



**Veiklioji medžiaga:** acetamipridas 200 g/kg (20 % w/w)

**Produkto forma:** vandenyje tirpios granulės

**Imprid Skog®** yra kontaktinio ir sisteminio veikimo neonikotinoidų cheminės grupės insekticidas, kuris naudojamas spygliuočių sodinukų apsaugai nuo didžiųjų pušinių straubliukų (*Hylobius abietis*).

**Imprid Skog®** pasižymi stipriu translaminariu veikimu. Nupurškus jis greitai pasiskirsto po visa augalą per apdorotas augalo dalis ir ima veikti vabzdžių centrinę nervų sistemą.

Produkto veikimas nepriklauso nuo temperatūros ar santykinės oro drėgmės. Lietus 2 val. po purškimo **Imprid Skog®** veiksmingumui įtakos neturi.

Spygliuočiai, sodinami miško želdiniuose, gali būti apdorojami prieš sodinimą, sodinant arba želdinių plotuose metus po pasodinimo. Svarbu sodinukus apdoroti tirpalu taip, kad būtų gerai padengtas šaknies kaklelis ir apatinė stiebo dalis.

Naudojimo laikas	Norma	Puškimo skaičius
Sodinukų stiebelių žievės apdorojimui daigynose arba sodinant mechaniškai	5% tirpalas = 50g produkto/litrui vandens	1
Želdinių plotuose metus po pasodinimo medelių stiebelių žievės apdorojimui	4ml 5% tirpalo/augalui	1

## Konteineriuose ir atvirų šaknų sodinukų apdorojimas medelyne prieš arba sodinimo metu:

- Sodinukus apdoroti juos mirkant/ panardinant arba purškiant, žemyn nukreiptais rankiniais, nugariniais purkštuvais.
- Apdorojimas medelyne turi būti atliktas naudojant uždara sistemą, kur paruoštas tirpalas recirkuliuoja. Prieš sodinukų pakavimą nuo šaknų turi būti pašalintas tirpalo perteklius. Prieš pakuojant, produktu apdoroti augalai turi išdžiūti.
- Apdoroti augalai turi būti tinkamai sandėliuojami, kad produkto likučiai neužterštų gamtos.

## Želdinių plotuose metus po pasodinimo:

- Purkšti įprastiniais, tinkamai sureguliuotais, techniškai tvarkingais rankiniais, nugariniais purkštuvais su 70 proc. dulksną mažinančiais purkštukais.